

XTRASIL N Lp

For surfôr og helgrøde med lavt TS-innhold. Verken ettsende eller korroderende, fungerer i alle surfôrssystem.

For å kunne høste til rett tid er det viktig å minimere avhengighet av været, med ensileringsmidler kan du få ett veldig god surfôr selv uten eller svært begrenset fortørking. XTRASIL N-Lp har en velprøvd sammensetning som gir god beskyttelse mot vekst av clostridia, listeria og andre uønskede mikroorganismer. De siste årenes forskning viser også at proteinnedbrytningen i surfôret er betydelig redusert med ensileringsmidler og en større andel av proteinbehovet kan komme fra surfôret.


XTRASIL Lp egner seg best til surfôr med lavt ts innhold, fra direkte høsting opp til ca 35 % TS. Produktet består for det meste av natriumnitritt og natriumformiat, som begge er svært effektive mot de fleste uønskede mikroorganismer. Samtidig har de svært liten negativ effekt på de naturlig forekommende melkesyrebakteriene.

For en viss beskyttelse mot gjær og mugg tilsettes også natriumbenzoat. For surfôr med høyere TS-innhold over 35 % anbefaler vi XTRASIL N-Ultra, som har høyere innhold av natriumbenzoat og inneholder også kaliumsorbat, da problemer med gjær og mugg øker med økende ts-innholdet.

Ensilasje behandlet med XTRASIL Lp må ikke utføres før tidligst 4 uker etter høsting.



- Rask pH senkning
- Reduserer proteinnedbrytningen
- Forbedrer lagringsstabiliteten



AgroVäst/SLU Dag-Axel Danielsson mfl. 2024

Helsåd Kernza
skörd 24 Maj 2024
Ts halt 25-30 %
Rådde försöksgård

Doseringstabell för XTRASIL N Lp. Liter per ton grönmassa.

Grönmassa	Ts-halt	Dosering*
Gräs/Rajgräs	< 25%	2,5
	25 - 30%	2,0
	30 - 35%	2,5
Helsäd	< 25%	3,0
	25 - 35%	2,5
Klöver, Klöver/Gräs	< 25%	2,5
	25 - 35%	2,0
Lusern, Lusern/Gräs	< 25 %	3,0
	25 - 35%	2,5

* Vid sämre förhållanden, minst +0,5l.

Doseringsteknikk:

XTRASIL N-Lp må tilsettes i forbindelse med høsting.

XTRASIL N-Lp krever ikke spesielt doseringsutstyr.

Sjekk at pumpen leverer tilstrekkelig mengde, **XTRASIL N-LP** har vanligvis høyere viskositet enn syrebaserte produkter. Når du bytter mellom syrebaserte midler og XTRASIL, skyll pumpen med vann for å unngå reaksjon mellom midlene.

Varmgang:

Vid høgre ts-halter oppstår ofte problem med varmgang. Når ts-halten går over 35% rekomenderar vi **XTRASIL N Ultra** som ger ett bra skydd mot jäst och mögel.

För ensilage som skall utfodras nästan omgående efter skörd rekommenderar vi **XTRASIL Majs HD**, den ger ett mycket bra skydd mot varmgång och kan utfodras omgående, ingen karen.

Tekniske data XTRASIL N-Lp:

Ingredienser:

Natriumnitritt (E 250), Natriumformiat, Natriumbenzoat, Kaliumsorbat

Tetthet: 1,20- 1,23 g / cm³

pH-verdi: 8- 10

Lagring:

Oppbevares tørt, mørkt og kjølig (froststabil til -20°C).

XTRASIL N-Lp kan lagres i minst 24 måneder fra produksjonsdatoen, i uåpnet originalemballasje.

Fodermedels lagstiftningen:

Samtlige ingredienser i XTRASIL N Lp är godkända som teknologiska tillsatser, i kategorin ensileringsmedel, enligt EUs förordning 1831 / 2003. .

Emballasje:

Kanner (25 liter)

Fat (200 liter)

IBC (1000 liter)

OBS!

Surfôr behandlet med **XTRASIL N-Lp** må ikke utfôres enn 4 uker etter høsting.

XTRASIL N-Lp må ikke blandes med syrer.