

XTRASIL Stabilizer Dry

Xtrasil Stabilizer Dry er et tilsetningsstoff for stabilisering av fullfôr. Varmgang er et problem som er mest vanlig i sommermånedene. Varmen genereres når gjær forbruker sukkeret i fôret, som i tillegg til varme også produserer karbondioksid og vann. Varmgang gir både dårligere fôropptak og lavere fôrverdi.

Når fôret blandes, blandes det også inn store mengder luft i materialet. Den gode tilgangen på oksygen er positivt for blant annet gjær og muggsopp. Fremfor alt kan gjær ha en nærmest eksplosiv vekst i det næringsrike fôret, sukkeret i fôret forbrukes raskt og vi får i stedet en sterk varmeutvikling. Fôret mister mye av sin næringsverdi og smak, noe som fører til redusert fôropptak og redusert produksjon. Hvor følsomt et fôr er for varme avhenger av hvor mye gjær som er i materialet, hvor mye lett tilgjengelig sukker fôret inneholder og temperaturen på materialet. Det er vanskelig å si hvordan et bestemt fôr oppfører seg i en bestemt situasjon, og det kan være store variasjoner mellom ulike fôrpartier og tider på året.

Biprodukter fra matproduksjon er vanligvis de mest utfordrende, selv om de inneholder svært lave mengder gjær når de forlater industrien. Mais og helgrøde kan også lett ta varme fordi de inneholder mye sukker. For grassurfôr er det vanligvis lagringstiden i siloen som avgjør, jo lenger surfôret lagres i et lufttett miljø, jo mindre følsom blir den for varme. Åpner du en førsteslått i august, er risikoen mye større enn om det gjøres i oktober. Ved blanding av ulike fôrtyper er det alltid fôret med dårligst lagringsstabilitet som avgjør resultatet.

Propionsyre har lenge vært brukt for å beskytte fôret mot varmgang. Den har god effekt mot gjær og mugg, men er lite behagelig å jobbe med. Som et alternativ har vi utviklet Xtrasil Stabilizer Dry, et tørt produkt basert på Benzosyre og Kaliumsorbitat. Deres normale struktur er krystallformet slik at du får et tørt og mye finere produkt å jobbe med. Effekten på gjær og muggsopp er minst like god som propionsyre.



- Fôrhindrar varmgang
- Minskar TS-fôrluster
- Fôrbâttrar foderupptaget



Doseringsanbefalinger

Ved akutte problemer tilsettes 3 kg **Xtrasil Stabilizer Dry** / tonn fôr. Hvis ønsket effekt er klart oppnådd, reduser med 0,5 kg/tonn fôr, fortsett til du "finner" riktig dosering. Doseringen må justeres ved bytte av fôrpartier, eller når været endrer seg. Tilsett Xtrasil Stabilizer Dry i begynnelsen av blandeprosessen, før du tilsetter grovfôret.

Tips:

Starter du blandeprosessen din med vitaminer og mineraler, bør ikke denne typen produkter (uansett merke) komme som nummer 2, men legge til noe fôrprodukt først. Syrer og salter kan ha en negativ effekt på vitaminer og mineraler, spesielt hvis de er coated.

Tekniske data Xtrasil Stabilizer Dry

Ingredienser: Benzosyre, Kaliumsorbat, Sepolite og Natriumklorid.

Oppbevaring:

Xtrasil Stabilizer oppbevares kjølig og frostfritt, kan lagres i minst 24 måneder fra produksjonsdato, i uåpnet originalemballasje.

Fôrlovgivning:

Xtrasil Stabilizer Dry - Forblending av fôrtilsetningsstoffer, Alle ingrediensene er oppført som teknologiske tilsetningsstoffer i henhold til EU-forordning VO 1831 / 2003.

Emballasje:

25 kg sekk.